

de Candamo 672

Tamaño: Muy pequeño.

Forma: Asimétrica, redondeada con base plana y un labio algo más desarrollado.

Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Vértice redondeado con esbozo de mamelón partido en la cúspide por la sutura. La base del mamelón está situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo en las dos caras, con cubeta muy pronunciada en el lado de la sutura.

Sutura: En general es ancha y rebajada aunque en alguna ocasión presentan surco ancho y profundo. Hendida en la cavidad del pedúnculo.

Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media.

Piel: Velloso, de pubescencia abundante y larga. **Color:** Domina el amarillo intenso del fondo. La chapa, de color rojo grana, está compuesta por punteado más o menos compacto que cubre con más intensidad una cuarta parte de la superficie dejando transparentar el fondo.

Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy dulce, aromática. **Sabor:** muy bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, con mucrón pequeño pero saliente y afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Cerca del ápice, la cresta se desvía hacia uno de sus laterales. Superficie áspera, muy esculpida con surcos anchos, profundos y largos, distribuidos por toda la superficie. En la zona peduncular, los surcos son más cortos y entre ellos hay algún orificio. Polo peduncular cerrado.

Maduración: Tercera decena de septiembre en Candamo (Oviedo).

